



cancer.org | 1.800.227.2345

Acerca de la leucemia en niños

Comience con una visión general sobre la leucemia en niños y las estadísticas clave de este cáncer en los Estados Unidos.

Visión general y tipos

Si su hijo ha sido diagnosticado con leucemia o hay algo que le inquieta sobre este cáncer, es probable que esté buscando respuestas a muchas preguntas. Comenzar con esta información básica es un buen punto de partida.

- [¿Qué es la leucemia en niños?](#)

Estadísticas e investigación

Consulte las más recientes estimaciones de nuevos casos y tasas de mortalidad para la leucemia infantil en los Estados Unidos. Además, conozca qué avances hay en las investigaciones sobre este cáncer.

- [Estadísticas importantes sobre la leucemia en niños](#)
- [¿Qué avances hay en las investigaciones sobre la leucemia en niños?](#)

¿Qué es la leucemia en niños?

- [Tipos de leucemia en los niños](#)
- [Médula ósea, sangre y tejido linfático normal](#)

- [Inicio y propagación de la leucemia](#)

El cáncer se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada. Las células en casi cualquier parte del cuerpo pueden convertirse en cáncer. Si desea más información sobre el cáncer, cómo se origina y se propaga, consulte [¿Qué es el cáncer?](#)¹ Para información sobre las diferencias entre los tipos de cáncer que ocurren en los adultos y en los niños, consulte [Cáncer en niños](#)².

Las **leucemias** son cánceres que se origina en las células que normalmente madurarían hacia los diferentes tipos de células sanguíneas. Con más frecuencia, la leucemia se origina en formas tempranas de glóbulos blancos, pero algunas leucemias comienzan en otros tipos de células sanguíneas.

Tipos de leucemia en los niños

Existen diferentes tipos de leucemia que se basan principalmente en:

- Si la leucemia es **aguda** (crecimiento rápido) o **crónica** (crecimiento más lento)
- Si la leucemia comienza en células **mieloides** o células **linfoides**

Cuando los médicos saben el tipo de leucemia específico que padece un niño, pueden hacer un mejor pronóstico y seleccionar el mejor tratamiento.

Leucemias agudas

La mayoría de las leucemias en niños son agudas. Estas leucemias pueden progresar rápidamente y, por lo general, deben tratarse de inmediato. Los dos tipos principales de leucemia aguda son:

- **Leucemia linfocítica aguda (linfoblástica):** alrededor de 3 de 4 leucemias en niños son leucemia linfocítica aguda (ALL, por sus siglas en inglés). Estas leucemias se originan en formas muy jóvenes de glóbulos blancos llamados linfocitos.
- **Leucemia mieloide aguda (AML):** este tipo de leucemia, también llamada leucemia mielógena aguda, leucemia mielocítica aguda o leucemia no linfocítica aguda, representa la mayoría de los casos remanentes de leucemia en niños. La leucemia mieloide aguda (AML) se inicia a partir de las células mieloides que forman normalmente los glóbulos blancos (que no son linfocitos), los glóbulos rojos o las plaquetas.

En pocas ocasiones, las leucemias agudas pueden tener características de la ALL y de la AML. A estos tipos de leucemias se les puede llamar **leucemias de linaje mixto**, **leucemias agudas indiferenciadas**, o **leucemias agudas bifenotípicas mixtas (MPAL)**. En los niños, son generalmente tratadas como la ALL y generalmente responden a este tratamiento como la ALL.

Tanto ALL como AML tienen subtipos, los cuales se describen en [Subtipos de la leucemia en niños](#)³.

Leucemias crónicas

Las leucemias crónicas son poco comunes en los niños. Estas leucemias suelen crecer más lentamente que las leucemias agudas, aunque también son más difíciles de curar. Las leucemias crónicas se pueden dividir en dos tipos principales:

- **Leucemia mieloide crónica (CML):** también se le conoce como leucemia **mielógena** crónica, y es poco común en los niños. El tratamiento es similar al empleado en adultos (consulte [Tratamiento para niños con leucemia mieloide crónica \[CML\]](#)⁴). Si desea más información sobre la CML, consulte [Leucemia mieloide crónica](#)⁵.
- **Leucemia linfocítica crónica (CLL):** esta leucemia se presenta muy pocas veces en los niños. Si desea más información, consulte [Leucemia linfocítica crónica \(CLL\)](#)⁶.

Leucemia mielomonocítica juvenil (JMML)

La leucemia mielomonocítica juvenil (JMML) es un tipo poco común de leucemia que no es crónica ni aguda. Se inicia a partir de las células mieloides, pero generalmente no crece tan rápidamente como la AML ni tan lentamente como la CML. Esta leucemia ocurre con más frecuencia en los niños de poca edad (la edad promedio de 4 años). Los síntomas pueden incluir piel pálida, fiebre, tos, moretones o sangrado que ocurre fácilmente, dificultad para respirar (debido a la presencia de demasiados glóbulos blancos en los pulmones), sarpullido y agrandamiento del bazo, el hígado y de los ganglios linfáticos. Para obtener información sobre el tratamiento de la JMML, consulte [Tratamiento para niños con leucemia mielomonocítica juvenil \(JMML\)](#)⁷.

Médula ósea, sangre y tejido linfático normal

Para entender la leucemia, ayuda conocer acerca de la médula ósea y los sistemas sanguíneo y linfático.

Médula ósea

La médula ósea es la parte blanda del interior de ciertos huesos que está formada por células productoras de sangre, células adiposas y tejidos de soporte. Un número reducido de las células productoras de sangre son *células madre*.

Las células madre sanguíneas experimentan una serie de cambios para producir nuevas células sanguíneas. Durante este proceso, las células se convierten en **linfocitos** (un tipo de glóbulo blanco) o en otras células productoras de sangre, las cuales son tipos de **células mieloides**. Las células mieloides se pueden desarrollar en glóbulos rojos, glóbulos blancos (que no sean linfocitos) o plaquetas.

Glóbulos rojos

Los glóbulos rojos transportan oxígeno desde los pulmones a todos los demás tejidos del cuerpo y devuelven el dióxido de carbono a los pulmones para ser eliminado.

Plaquetas

Las **plaquetas** en realidad son fragmentos celulares producidos por un tipo de célula de la médula ósea que se llama megacariocito. Las plaquetas son importantes para detener el sangrado al sellar pequeños orificios en los vasos sanguíneos.

Glóbulos blancos

Los **glóbulos blancos** ayudan al cuerpo a combatir infecciones. Existen distintos tipos de glóbulos blancos:

- Los **linfocitos** son células maduras que se desarrollan de los *linfoblastos*, un tipo de célula productora de sangre en la médula ósea. Los linfocitos son las principales células que constituyen el tejido linfático que es una parte importante del sistema inmunitario. El tejido linfático se encuentra en los ganglios linfáticos, el timo (un órgano pequeño detrás del esternón), el bazo, las amígdalas y las glándulas adenoides, y la médula ósea. También se encuentra disperso en todo el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Hay dos tipos principales de linfocitos: **células B** y **células T**. (ALL, el tipo más común de leucemia infantil, puede comenzar en las células B o en las células T). Para más información,

consulte [Subtipos de la leucemia en niños](#)⁸.

- Los **granulocitos** son glóbulos blancos maduros que se desarrollan de los mieloblastos, un tipo de célula productora de sangre en la médula ósea. Los granulocitos tienen gránulos que aparecen como manchas al observarlos con un microscopio. Estos gránulos contienen enzimas y otras sustancias que pueden destruir gérmenes como las bacterias. Los tres tipos de granulocitos, (neutrófilos, basófilos y eosinófilos) se distinguen por el tamaño y el color de los gránulos cuando se observan al microscopio.

Los **monocitos** se desarrollan a partir de monoblastos productores de sangre en la

5. www.cancer.org/es/cancer/tipos/leucemia-mieloide-cronica.html
 6. www.cancer.org/es/cancer/tipos/leucemia-linfocitica-cronica.html
www.cancer.org/es/cancer/tipos/leucemia-en-ninos/tratamiento/ninos-con-
-

Estadísticas importantes sobre la leucemia en niños

los niños estadounidenses de raza negra y los de raza asiática, y es más común entre los niños que entre las niñas.

- La AML ocurre casi igualmente entre niños y niñas de todas las razas.

Las leucemias crónicas son poco comunes en los niños. La mayoría de los casos son **leucemia mieloide crónica (CML)**, la cual tiende a ocurrir más en adolescentes que en niños de menor edad.

La **leucemia mielomonocítica juvenil (JMML)** es también poco común, y generalmente ocurre en niños de corta edad (la edad promedio es de aproximadamente 2 años). Esta leucemia es algo más frecuente en los niños que en las niñas.

Visite el [Centro de Estadísticas sobre el Cáncer de la Sociedad Americana Contra El Cáncer](#)¹ para más información sobre estadísticas importantes.

Para obtener las estadísticas relacionadas con la supervivencia, consulte [Tasas de supervivencia de las leucemias en niños](#)².

Hyperlinks

1. cancerstatisticscenter.cancer.org/
2. www.cancer.org/es/cancer/tipos/leucemia-en-ninos/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/tasas-de-supervivencia.html
3. www.cancer.org/es/cancer/tipos/leucemia-en-ninos/referencias.html

Referencias

American Cancer Society. *Cancer Facts & Figures 2023*. Atlanta, Ga: American Cancer Society; 2023.

American Cancer Society. *Cancer Facts & Figures 2020*. Atlanta, Ga: American Cancer Society; 2020.

Arceci RJ, Meshinchi S. Chapter 20: Acute Myeloid Leukemia and Myelodysplastic Syndromes. In: Pizzo PA, Poplack DG, eds. *Principles and Practice of Pediatric Oncology*. 7th ed. Philadelphia Pa: Lippincott Williams & Wilkins; 2016.

Caywood EH, Kolb EA. Juvenile myelomonocytic leukemia. UpToDate. 2018. Accessed at www.uptodate.com/contents/juvenile-myelomonocytic-leukemia on November 29, 2018.

Rabin KR, Gramatges MM, Margolin JF, Poplack DG. Chapter 19: Acute Lymphoblastic Leukemia. In: Pizzo PA, Poplack DG, eds. *Principles and Practice of Pediatric Oncology*. 7th ed. Philadelphia Pa: Lippincott Williams & Wilkins; 2016.

Rabin KR, Margolin JF, Kamdar KY, Poplack DG. Chapter 100: Leukemias and Lymphomas of Childhood. In: DeVita VT, Lawrence TS, Rosenberg SA, eds. *DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles and Practice of Oncology*. 10th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams & Wilkins; 2015.

Wei MC, Dahl GV, Weinstein HJ. Chapter 61: Acute Myeloid Leukemia in Children. In: Hoffman R, Benz EJ, Silberstein LE, Heslop H, Weitz J, Anastasi J, eds. *Hematology: Basic Principles and Practice*. 6th ed. Philadelphia, Pa. Elsevier; 2013.

[Consulte todas las referencias para el leucemia en niños aquí.](#)³

Actualización más reciente: enero 12, 2023

¿Qué avances hay en las investigaciones sobre la leucemia en niños?

- [Genética](#)
- [Causas y posible prevención](#)
- [Estudios clínicos](#)
- [Inmunoterapia para tratar la leucemia en niños](#)
- [Nuevos medicamentos de terapia dirigida para tratar la AML](#)

Los investigadores en muchos centros médicos, hospitales universitarios y otras instituciones, están estudiando las causas, el diagnóstico y el tratamiento de la leucemia en niños.

Genética

Los científicos están logrando avances en comprender mejor [cómo los cambios en el ADN del interior de las células madre de la médula ósea](#)¹ pueden causar que se conviertan en células de leucemia. El estudio de estos cambios genéticos puede ayudar a comprender por qué las células de leucemia crecen inmaduras y de forma incontrolada en vez de crecer como células sanguíneas maduras con funciones normales. Actualmente, los médicos usan estos cambios para ayudarles a determinar el pronóstico de la enfermedad y así poder escoger el tratamiento que probablemente sea mejor para el niño.

Este progreso ha dado como resultado pruebas mucho mejores y más sensibles para detectar células leucémicas en muestras de sangre o de médula ósea. Por ejemplo, la prueba de la **reacción en cadena de la polimerasa (PCR)** puede identificar números muy pequeños de células leucémicas basándose en sus cambios cromosómicos. Esta prueba es útil para determinar si la leucemia ha sido completamente destruida o si persiste en pequeñas cantidades que más tarde pueden ocasionar una recaída, si no se administra más tratamiento. Las pruebas más recientes, conocidas como pruebas de **secuenciación de próxima generación (NGS)**, se están comenzando a utilizar y podrían ayudar aún más en esta área.

Causas y posible prevención

Los investigadores continúan buscando las posibles causas de la leucemia en los niños, estas causas podrían incluir una combinación de exposiciones genéticas y ambientales.

Por ejemplo, una teoría que ha ganado terreno en los últimos años es que algunas leucemias infantiles podrían ser causadas por una combinación de ciertos cambios genéticos que ocurren muy temprano en la vida (incluso antes del nacimiento), junto

su primer año de vida (lo que los habría expuesto a infecciones comunes más temprano).

Se necesitan más investigaciones para confirmar esta teoría. Pero si se confirma, podría ser posible reducir el riesgo de leucemia infantil asegurándose de que los niños estén expuestos a ciertos gérmenes muy temprano en la vida.

Estudios clínicos

La mayoría de los niños con leucemia reciben tratamiento en los principales centros médicos, donde el tratamiento a menudo se administra como parte de [estudios clínicos](#)², y así también ayudar a que obtengan el cuidado más actualizado. Varias preguntas importantes se están estudiando por medio de los estudios clínicos, entre ellas están:

- ¿Por qué algunos niños con leucemia linfocítica aguda (ALL) experimentan la recurrencia de la enfermedad después del tratamiento y cómo se puede prevenir esto?
- ¿Existen otros [factores pronósticos](#)³ que ayuden a identificar cuáles niños necesitan tratamientos de mayor, o por el contrario, de menor intensidad?
- ¿Se puede revertir la resistencia a los medicamentos usados en la quimioterapia de la leucemia mielógena aguda (AML)?
- ¿Existen mejores medicamentos o combinaciones de medicamentos para tratar los diferentes tipos de leucemia en niños?
- ¿Cuándo se debe usar un [trasplante de células madre](#)⁴ para tratar la leucemia?
- ¿Qué tan eficaces son los trasplantes de células madre en niños que no tienen un hermano o hermana con un tipo de tejido compatible?
- ¿Puede un segundo trasplante de células madre ayudar a los niños que experimentan una recaída después de un primer trasplante de células madre?
- ¿Cuáles son los mejores métodos de tratamiento para los niños que tienen los tipos de leucemia menos comunes, como la [leucemia mielomonocítica juvenil \(JMML\)](#)⁵ y la [leucemia mieloide crónica \(CML\)](#)⁶?

Inmunoterapia para tratar la leucemia en niños

Las inmunoterapias son tratamientos que estimulan el sistema inmunitario de un niño para ayudar a combatir la leucemia. Algunos tipos de inmunoterapia han demostrado ser muy prometedores en el tratamiento de la leucemia en niños, incluso cuando otros

tratamientos ya no son eficaces.

Terapia de células T con receptores quiméricos de antígenos (CAR)

En este tratamiento, las células inmunes llamadas **células T** se extraen de la sangre del niño y se alteran genéticamente en el laboratorio para ayudarlas a atacar a las células de la leucemia. Luego las células T se regresan a la sangre del niño para que puedan buscar a las células leucémicas por todo el cuerpo.

Actualización más reciente: agosto 26, 2019

Escrito por

Equipo de redactores y equipo de editores médicos de la American Cancer Society (<https://www.cancer.org/cancer/acs-medical-content-and-news-staff.html>)

Nuestro equipo está compuesto de médicos y enfermeras con postgrados y amplios conocimientos sobre el cáncer, al igual que de periodistas, editores y traductores con amplia experiencia en contenidos médicos.

La información médica de la American Cancer Society está protegida bajo la ley *Copyright* sobre derechos de autor. Para solicitudes de reproducción, por favor refiérase a nuestra Política de Uso de Contenido (www.cancer.org/about-us/policies/content-usage.html) (información disponible en inglés).

cancer.org | 1.800.227.2345